



Thuốc Chích Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung- Những Điều Cha Mẹ có Con Tuổi Vị Thành Niên Cần Biết

Mỗi năm tại Hoa Kỳ, khoảng 12,000 phụ nữ bị bệnh ung thư cổ tử cung và gần 4,000 phụ nữ thiệt mạng vì nó. Ung thư cổ tử cung do một loại vi-rút thông thường được gọi là human papillomavirus, hay “HPV” gây ra.

Vi-rút human papillomavirus (HPV) là gì?

HPV là một loại vi-rút thông thường lây nhiễm qua đường tình dục. Có rất nhiều loại vi-rút HPV. Một số loại có thể gây ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. Một số loại HPV khác có thể gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục. Nhưng trong đa số trường hợp, HPV không cho thấy bất kỳ triệu chứng nào và không gây ra các vấn đề sức khỏe. HPV xảy ra rất thông thường nên đa số người lớn đều bị nhiễm vi khuẩn này ở một giai đoạn nào đó trong đời của họ. Đa số mọi người hầu như không hề biết họ bị nhiễm vi khuẩn này. HPV xảy rất thông thường ở giới trẻ ở giai đoạn tuổi thiếu niên và vào những năm đầu tuổi 20.

Thuốc chích ngừa ung thư cổ tử cung (còn gọi là thuốc chích ngừa HPV) là gì?

Thuốc chích ngừa ung thư cổ tử cung bảo vệ chống lại các loại HPV thường gây ra bệnh ung thư cổ tử cung và các mụn cóc ở bộ phận sinh dục nhất.

Những ai nên chích ngừa HPV?

Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh Hoa Kỳ (CDC) và bác sĩ khuyến khích các bậc phụ huynh nên chích ngừa cho mọi bé gái ở tuổi 11 và 12. Các bé gái và phụ nữ từ 13 đến 26 cũng nên chích ngừa nếu các em chưa được chích ngừa khi còn trẻ hơn hay khi chưa chích đủ 3 mũi thuốc. Lý tưởng nhất là cho các bé gái chích ngừa trước khi có quan hệ tình dục lần đầu tiên khi các em có thể có nguy cơ tiếp xúc với HPV. Lý do là bởi vì loại thuốc chích ngừa này không có hiệu quả cao đối với những người đã từng tiếp xúc với loại vi-rút này trước khi chích ngừa.

Thuốc chích ngừa này có hiệu quả không?

Thuốc chích ngừa này rất có hiệu quả. Sự bảo vệ có được từ thuốc chích ngừa sẽ hữu hiệu ít nhất là 5 năm. Các bác sĩ hiện chưa biết liệu có cần thêm một mũi bổ sung hay không.

Thuốc chích ngừa này có an toàn không?

Thuốc chích ngừa này đã được cấp giấy phép là an toàn. Thuốc chích ngừa này đã được nghiên cứu ở hàng ngàn thiếu nữ và phụ nữ tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Phản ứng phụ thông thường nhất là cảm giác đau ở cánh tay nơi chích được chích ngừa. Phản ứng phụ nghiêm trọng hiếm xảy ra.

Tôi có được giúp đỡ về phí tổn chích ngừa không?

Đối với các gia đình có bảo hiểm sức khỏe, hầu như chi phí chích ngừa này sẽ được bảo hiểm trả. Trẻ em 18 tuổi trở xuống có thể hợp lệ được chích ngừa miễn phí qua Chương Trình Chích Ngừa cho Trẻ Em (VFC) nếu họ ở trường hợp: đang có Medicaid, hay không có bảo hiểm. Để tìm hiểu thêm về chương trình VFC, hỏi thăm bác sĩ của con em mình hay liên lạc cơ quan Y Tế Tiểu Bang.

Có cần chích ngừa cho các bé trai không?

Các cuộc nghiên cứu đang được thực hiện để tìm hiểu xem thuốc chích ngừa này có hiệu quả cho các bé trai hay không. Khi có đầy đủ các thông tin này, thuốc chích ngừa này có thể sẽ được cấp giấy phép và được đề nghị chích cho các bé trai và phái nam.



Để biết thêm thông tin về thuốc chích ngừa,
xin hỏi các nhà cung cấp y tế cho con trẻ của
quý vị hay gọi 800-232-4636 (chỉ nói tiếng Anh).
www.cdc.gov/vaccines/preteen/vit